



## Наши ответы на Ваши вопросы

В этом разделе мы постарались ответить на наиболее часто задаваемые родителями наших пациентов вопросы. Будем благодарны Вам, если Вы оставите свой вопрос на нашем сайте, пройдя по ссылке:  
[https://dgp30.ru/contact\\_chief\\_doctor/](https://dgp30.ru/contact_chief_doctor/)

**Вопрос: Содержит ли вакцина, используемая поликлиникой тиомерсал?**

**Ответ:**

Нет.

Ни одна вакцина, зарегистрированная в Российской Федерации для применения у детей до 18 лет и беременных, не содержит консервант (тиомерсал/мертиолят).

ГБУЗ «ДГП № 30  
ДЗМ»  
dgp30.ru



Вопрос: Какие вакцины предпочтительны?

**Ответ: Предпочтительны инактивированные вакцины – расщепленные (сплит -вакцины) и субъединичные.**

**Сейчас в поликлиниках, садах и школах города Москвы мы используем именно такую вакцину Совигрипп.**

**С инструкцией вы можете подробно ознакомиться на нашем сайте в разделе «Вместе против гриппа»**

Вопрос: Как я могу быть уверен, что используемая вакцина соответствует данному сезону.

Ответ:

Вы можете подтвердить это информацией в инструкции к препарату. Кроме того, Вы можете увидеть на упаковке вакцины дату изготовления и срок годности- они соответствуют только данному сезону.

Вопрос: Почему в вакцинах Совигрипп и Гриппол плюс активного вещества меньше? Влияет ли это на их эффективность? Может, мне стоит выбрать другую вакцину, в которой больше активного вещества?

Ответ: В вакцинах, содержащих адьювант ( в Совигриппе это Совидон, в Гриппол плусе-Полиоксидоний), активное вещество снижено, так как адьювант является иммуномодулятором и задерживает активное вещество в организме. Таким образом, антигенная нагрузка на организм снижается, а ответ иммунный такой же, как при высоких дозах антигенов




## Нужно ли прививать детей до 3 лет?

Дети до 6 месяцев защищены материнскими антителами, а со 2-го полугодия являются наиболее восприимчивыми к гриппу. Вирусы гриппа и парагриппа часто вызывают ларингиты со стенозом (ложный круп), бронхиты, в том числе обструктивные и вирусные пневмонии в данной возрастной группе.

Почему моему старшему ребенку ввели одну дозу, а его годовалому брату нужно сделать 2 дозы?

У большинства старших детей и взрослых сохраняется иммунологическая память о предыдущих вирусах гриппа и 1 новой инъекции достаточно для ее «обновления». Детям же, ранее не привитым и не болевшим гриппом, вводят 2 дозы только в 1-й раз, а в последующие сезоны им делают 1 прививку.



Можно ли прививать моего ребенка, если он болен бронхиальной астмой?

Да, и это обязательно. Современные вакцины безопасны для детей с хроническими заболеваниями, а вот грипп для них наиболее опасен! Поэтому врачи-специалисты по всему миру своим пациентам, даже с онкологическими заболеваниями, и членам их семей ежегодно проводят вакцинацию против гриппа.

А есть ли противопоказания к вакцинации против гриппа?

Специальных противопоказаний к современным противогриппозным вакцинам нет.

Они общие для большинства вакцин:

- 1) Острые состояния (лихорадка, обострение хронических заболеваний);
- 2) Аллергия к компонентам вакцины ( в случае Совигриппа- аллергия к белку куриного яйца);
- 3) Выраженная (сильная) реакция на предыдущую вакцинацию.

